

Dr. med. Gery Teufelberger, Chefarzt Chirurgie
 Dr. med. Markus von der Groeben, Leitender Arzt Chirurgie
 Dr. med. Hans Suter, Leitender Arzt Medizin

Welche Medikamente können nach einer bariatrischen Operation eingenommen werden?

Nachfolgende Übersicht zeigt, welche Wirkstoffe und Schmerzmedikamente nach einer bariatrischen Operation eingenommen oder vermieden werden sollten.

Wir weisen darauf hin, dass diese Tabelle den Anspruch auf Vollständigkeit nicht erfüllt und nur zur Orientierung dient.

Wirkstoff	Name des Präparates	Erlaubt?
Metamizol	z.B. Minalgin®, Novalgin®, Novaminsulfon Sintetica®	Ja
Paracetamol	z. B. Ben-u-ron®, Dafalgan®	Ja
Scopolaminbutylbromid	z.B. Buscopan®	Ja
Tramadol	z.B. Tramal®	Ja
Tilidin	z.B. Valeron®	Ja
Acemetacin	z.B. Tilur®	Vielleicht
Etodolac	z.B. Lodine®	Vielleicht
Acetylsalicylsäure	z.B. Aspirin®, Aspirin Cardio®	Nein
Celecoxib	z.B. Celebrex®	Nein
Dexibuprofen	z.B. Deltaran®	Nein
Dexketoprofen	z.B. Sympal®, Ketesse®	Nein
Diclofenac	z.B. Voltaren®, Diclofen®	Nein
Etoricoxib	z.B. Arcoxia®	Nein
Flurbiprofen	z.B. Dobendan®	Nein
Ibuprofen	z.B. Algifor®, Brufen®, Dismenol®, Dolocyl®, Grefen®, Ibuprofen®, Irfen®, Saridon®	Nein
Indometacin	z.B. Indophtal®, Elmetacin®, Indocid®	Nein
Lumiracoxib	z.B. Prexige®	Nein
Mefenaminsäure	z.B. Ponstan®, Mefenacid®	Nein
Naproxen	z.B. Apranax®, Proxen®	Nein
Parecoxib	z.B. Dynastat®	Nein